

কৃষ ৪০ এসসি ধানক্ষেতের নির্বাচিত আগাছানাশক, যা গজানোর পর ধানক্ষেতের প্রধানতম আগাছাসমূহকে দমন করে।

সাবধানতা : প্রতিরোধকমূলক দস্তানা ও কাপড়চোপড় ব্যবহার করুন। কৃষ ৪০ এসসি মুখে দেবেন না, গন্ধ নেবেন না। কৃষ ৪০ এসসি ব্যবহারের পর শরীর ও জামা-কাপড় সাবান ও পর্যাপ্ত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ছিটানোর সময় কিছু ঝাওয়া বা ধূমপান করা নিষেধ। বাতাসের অনুকূলে স্প্রে করুন। পুকুর বা অন্য কোন পানির উৎস যেন বালাইনাশক দ্বারা দূষিত না হয় সে দিকে খেয়াল রাখুন। কৃষ ৪০ এসসি প্রয়োগের ৭-১৪ দিনের মধ্যে জমি থেকে ফসল উঠানো ও জমির ভিতরে গবাদি পশু-পাখি প্রবেশ নিষেধ।




কৃষ ৪০ এসসি

প্রতি লিটারে ৪০০ মিলি বিসপাইইথোস
গেজিটম কিসমেন

পণ্যটি ঘাটাই করতে চ্রি বস ককন
০৮০০ ৮০০ ১৯৮৪

একমর পরিলেপক
সেই পোটিসাইডস লিঃ
কম্পো গ্রুপে একটি ব্র্যান্ড

প্রাকৃতিক পরিমার্ণ

www.nazco.com

বিষক্রিয়ার লক্ষণ : মাথাধরা, বমি বমি ভাব, বৃকে ব্যাথা অনুভব করা।
প্রাথমিক চিকিৎসা : হঠাৎ কেউ গিলে ফেললে বমি করান। অচেতন রোগীকে বমি করানোর চেষ্টা করবেন না। শরীরে লাগলে সাথে সাথে সাবান ও পর্যাপ্ত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

- গ্রন্থকর্তারক রেজিঃ হোস্তার ও আমদানীকারক :
- রেজিঃ নং : ৪ ইউপিএল বিয়ার্সে, ঢাকা।
- ব্যাচ নং : ৪ রাইসকো ইউটারন্যাশনাল বাংলাদেশ লিমিটেড
- উৎপাদনের তারিখ : ৪ এপি-৫২১৪
- মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ : ৪
- সর্বোচ্চ মৃত্যু মূল্য : ৪
- সিকিউরিটি কোড : ৪

প্রতিষেধক : সঠিক কোন প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।
গুদামজাতকরণ : কৃষ ৪০ এসসি বাদ্য ও পশুখাদ্য হতে দূরে রাখুন, আলোকিত ও বায়ু চলাচল করে এমন প্রশস্ত ঘরে তালাবদ্ধ আলমারিতে সংরক্ষণ করুন।

প্রয়োগক্ষেত্র ও মাত্রা : ১ বাগ = ৫ লিটার

ফসল	আবাদ্য	১০ লিটার পানি (৫ শতক জমি)	একর	হেক্টর
ধান	বিশ্রাম, পটল, চোলা, মাসুর	৩ লিটার	৬০ লিটার	১৫০ লিটার

বালাইনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর

